

¿Me interesa leerlo?

¿Me interesa leer el número 4 de 2022?

Contesta a nuestras preguntas marcando sí o no en la casilla correspondiente. Comprueba si son correctas al final del test. Consulta nuestras recomendaciones de lectura según el resultado que hayas obtenido.

EDITORIAL

Cómo conseguir que los residentes pongan en valor la pediatría de Atención Primaria

Pregunta	Sí	No
La principal salida laboral de los residentes de pediatría, en los últimos años, es la Pediatría de Atención Primaria		
Favorecer la formación presencial con sustitución y posibilidades de ofertar docencia es uno de los factores que harían más atractivo el trabajo del pediatra de atención primaria		

MÁS ALLÁ DE LA CLÍNICA

Programa de identificación del riesgo psicosocial en la infancia y la adolescencia (II)

Pregunta	Sí	No
En España la mayor parte de las políticas sociales son desarrolladas a nivel autonómico y municipal		
El antecedente de prematuridad constituye un factor de riesgo psicosocial		

PUESTA AL DÍA EN...

Diagnóstico diferencial de la ictericia en el lactante y niño mayor

Pregunta	Sí	No
El aumento de hiperbilirrubinemia directa indica lesión hepatocelular, afectación biliar o patología hereditaria, por lo que se deberá completar el estudio con una prueba de imagen, generalmente ecografía abdominal		
Ante todo paciente con ictericia, el objetivo es orientar el proceso diagnóstico en función del tipo de bilirrubina predominante —indirecta o directa—, a lo que se añadirán pruebas analíticas y/o de imagen en función de la fracción de bilirrubina elevada predominante		

DEL SÍNTOMA AL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Hiperfosfatemia transitoria benigna de la infancia

Pregunta	Sí	No
La hiperfosfatemia transitoria benigna de la infancia es propia de niñas mayores de 10 años		
Valores de fosfatasa alcalina seis veces mayores que el rango superior para la edad son diagnósticos de hiperfosfatemia transitoria benigna de la infancia con una probabilidad del 95%		

PEQUEÑECES Y RAREZAS

Hiperpigmentación de falanges distales en el lactante

Pregunta	Sí	No
La hiperpigmentación de las falanges distales de un lactante es un signo precoz de la enfermedad de Addison		
La hiperpigmentación de las falanges distales de un lactante es un signo precoz de hiperplasia suprarrenal congénita		

USO RACIONAL DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

El papel de la ecografía en la detección de un derrame articular en Pediatría

Pregunta	Sí	No
La ecografía articular es útil para detectar la presencia de derrame articular, con una sensibilidad de entre el 90 y 100%		
En la enfermedad Legg-Perthes-Calvé los cambios radiológicos preceden al derrame articular, por lo que la ecografía no ofrecerá ningún valor diagnóstico		

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN AP?

En niños, ¿se puede acortar el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad a 3 días?

Pregunta	Sí	No
Los expertos se inclinan, en nuestro país, por utilizar una dosis doble de amoxicilina, en dos o tres dosis al día, con una duración de 3 días		
Hay una revisión Cochrane que sostiene que un ciclo corto (3 días) de antibioticoterapia es tan efectivo como un tratamiento más prolongado (5 días) para la NAC no grave en los niños menores de 5 años de edad		

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Trastorno específico del aprendizaje: detección precoz en la consulta de Atención Primaria

Pregunta	Sí	No
Los trastornos específicos del aprendizaje son trastornos crónicos del neurodesarrollo con base neurobiológica y componente genético		
Los niños con trastornos del aprendizaje presentan mayor frecuencia de trastornos de ansiedad, baja autoestima y motivación y problemas de conducta		
Es responsabilidad del pediatra de AP establecer el diagnóstico de los trastornos específicos del aprendizaje		

RINCÓN DEL RESIDENTE

Dermatosis neglecta y la prueba del algodón

Pregunta	Sí	No
La dermatosis neglecta es debida, en exclusiva, a falta de higiene		
Las lesiones de la dermatosis neglecta se caracterizan por desaparecer frotando vigorosamente con agua y jabón		