

¿Me interesa leerlo?

¿Me interesa leer el número 4 de 2023?

Contesta a nuestras preguntas marcando sí o no en la casilla correspondiente. Comprueba si son correctas al final del test. Consulta nuestras recomendaciones de lectura según el resultado que hayas obtenido.

EDITORIAL

Mutilación genital femenina (MGF), situándonos en las fronteras

Pregunta	Sí	No
La mutilación genital femenina constituye un reto en la atención a los menores migrantes, cuyo abordaje adecuado comprende: conocimiento de la materia, trabajo en red con otras disciplinas y un acercamiento a los valores y creencias de la familia desde el respeto y la empatía. ¿Sabe si se practica en otros continentes además de en África?		
Entre los tipos de MGF, ¿es en el IV en el que más atención hay que prestar?		

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA

Alimentación saludable en la infancia (II). Educación alimentaria: el rol de la persona adulta y las guías alimentarias

Pregunta	Sí	No
La pirámide alimentaria española es la guía alimentaria menos concordante con la evidencia científica actual		
Insistir a los niños para que prueben o coman una determinada cantidad de algún alimento con la finalidad de fomentar la diversificación y la inclusión de alimentos saludables suele conducir a una buena aceptación del alimento		
Todas las guías alimentarias disponibles tienen un nivel cualitativo y de actualización similares		

SITUACIONES CLÍNICAS

Masa mamaria en adolescentes: ¿qué debe preocuparnos?

Pregunta	Sí	No
La ectasia ductal mamaria puede presentarse como una masa azulada bajo el pezón y a veces asociar una secreción viscosa y espesa		
Cualquier secreción del pezón nos hace sospechar cáncer de mama o tumor filoide		
La mamografía es la prueba de elección para, en un primer paso, distinguir masas quísticas sólidas en la mama		

DEL SÍNTOMA AL DIAGNÓSTICO

¿Tortícolis o algo más?

Pregunta	Sí	No
Las tortícolis cuyo origen es una patología del sistema nervioso central se presentan de forma explosiva, con fiebre y afectación del estado general		
Las tortícolis secundarias a un estrabismo con diplopía desaparecen durante el sueño		
La duración de una tortícolis más de 7 días nos obliga a replantar el diagnóstico inicial de tortícolis postural		

PEQUEÑECES Y RAREZAS

Dermatitis friccional liquenoide

Pregunta	Sí	No
El prurigo estival de Sutton es sinónimo de la dermatitis friccional liquenoide		
La protección solar ha demostrado ser una medida preventiva útil para la dermatitis friccional liquenoide		
La dermatitis friccional liquenoide responde al metronidazol tópico		

MÁS ALLÁ DE LA CLÍNICA

Programas de optimización de uso de antibióticos (PROA) en Atención Primaria: una responsabilidad pediátrica

Pregunta	Sí	No
En los últimos años se registra en España una tendencia ascendente en el consumo de antibióticos		
Se ha estimado que el 90% del consumo de antibióticos se genera en Atención Primaria		
En comparación con países de nuestro entorno, la prescripción antibiótica en Pediatría de Atención Primaria es sensiblemente superior a la de países del norte y centro de Europa, especialmente en los niños menores de 3 años		

USO RACIONAL DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Trastornos del neurodesarrollo. Utilidad del DMS-5

Pregunta	Sí	No
Los trastornos del neurodesarrollo según el DSM-5 son déficits en el desarrollo producidos en el periodo de desarrollo que producen limitaciones en áreas específicas o globales y dificultades en lo personal, social, académico o en el funcionamiento ocupacional del niño		
Los trastornos del desarrollo neurológico según el DSM-5 son: discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastorno del espectro del autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje, trastornos motores, trastornos de tics y otros trastornos del desarrollo neurológico		

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN PEDIATRÍA DE AP?

Alergia al cacahuete en niños: probable ventana de oportunidad para la desensibilización

Pregunta	Sí	No
La alergia al cacahuete se resuelve espontáneamente a los dos años de vida en la mayoría de los casos		
La desensibilización oral al cacahuete no está indicada por la falta de evidencia de su eficacia y el riesgo de efectos secundarios graves		
La desensibilización oral parece eficaz para favorecer la adquisición de tolerancia en niños con alergia al cacahuete, en especial si se realiza a edades tempranas		

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Enfermedad meningocócica invasiva (EMI): situación actual y estrategias de prevención

Pregunta	Sí	No
La pandemia por SARS-CoV-2 produjo un incremento muy acusado de la EMI		
En España, en la temporada 2022-2023, el serotipo más frecuente causante de EMI es el B, seguido del W		
La exposición al humo del tabaco es un factor de riesgo individual de desarrollo de EMI		

EL RINCÓN DEL RESIDENTE

Nicturia e hipertiroidismo: una relación poco conocida

Pregunta	Sí	No
El hipertiroidismo en la infancia presenta una sintomatología característica y llamativa de forma precoz, por lo que su diagnóstico es rápido		
La nicturia, taquicardia, amenorrea y pérdida de peso son síntomas sugestivos de hipertiroidismo		