

## ¿Me interesa leerlo?

# ¿Me interesa leer el número 2 de 2024?

Contesta a nuestras preguntas marcando sí o no en la casilla correspondiente. Comprueba si son correctas al final del test. Consulta nuestras recomendaciones de lectura según el resultado que hayas obtenido.

### EDITORIAL

#### Deus ex machina: intentando explicar la inteligencia artificial

Pregunta	Sí	No
La inteligencia artificial (IA) crea programas informáticos que desarrollan operaciones comparables a las que realiza la mente humana y es capaz de detectar y eliminar los sesgos y prejuicios que afectan a los seres humanos		

### SITUACIONES CLÍNICAS

#### Infección por *Aeromonas*

Pregunta	Sí	No
La ESPGHAN recomienda que, ante la sospecha de una proctocolitis leve, en ausencia de síntomas atópicos, en un bebé alimentado con leche materna, no se modifique la dieta de la madre durante el primer mes de hematoquecia		
Las bacterias más frecuentes causantes de diarrea aguda en la infancia son: <i>Campylobacter jejuni</i> y <i>Salmonella</i> no tifoidea		
En la diarrea del viajero moderada o grave producida por <i>E. coli</i> enterotoxigénica, el antibiótico de primera elección es clotrimazol		

### PEQUEÑECES Y RAREZAS

#### Algo más que una otalgia

Pregunta	Sí	No
En las pericondritis de la oreja, secundarias a <i>piercing</i> , es más frecuente que esté implicada <i>Pseudomona aeruginosa</i>		
Los abscesos en el cartílago auricular precisan drenaje y tratamiento antibiótico anti- <i>Pseudomona</i>		
La pericondritis, como complicación de la otitis externa, tiene un porcentaje mayoritario de buena respuesta al tratamiento con antibióticos anti-grampositivos		

### MÁS ALLÁ DE LA CLÍNICA

#### Programa de identificación del riesgo psicosocial en la infancia y la adolescencia (VI). Factores personales (cont.): carencia afectiva, conducta antisocial, absentismo y abandono escolar

Pregunta	Sí	No
Las experiencias de victimización en la infancia incrementan el riesgo de depresión en la edad adulta		
Los problemas de conducta en la infancia son determinantes de la violencia futura		
Los factores culturales relacionados con la disciplina, el desarrollo moral y la tolerancia de la conducta inadecuada son particularmente determinantes para el desarrollo del comportamiento antisocial		

## APUNTES DE GESTIÓN

### Bebidas energéticas: características, conocimiento, consumo y regulación

Pregunta	Sí	No
Las bebidas energéticas se caracterizan por contener sustancias estimulantes del sistema nervioso central, siendo el principal componente la cafeína, con una concentración media entre 20-40 mg de cafeína por 100 g, y por la ausencia de alcohol. Se publicitan como bebidas capaces de disminuir la fatiga, aumentar la resistencia física y la habilidad mental, lograr una mayor concentración, evitar el sueño y dar sensación de bienestar		
Los grupos de adolescentes en los que se ha observado un mayor consumo de bebidas energéticas son los varones, los consumidores de tabaco o alcohol y los que tienen una situación sociofamiliar complicada, siendo, por tanto, los grupos de mayor riesgo de efectos secundarios		

## MEJORANDO HABILIDADES EN...

### Diagnóstico y tratamiento de la anquiloglosia en el bebé

Pregunta	Sí	No
La hipertrofia de mofletes ("de trompetista") no suele ser sugestiva de anquiloglosia		
La maniobra de Murphy consiste en la expresión del frenillo al elevar la lengua		
Es recomendable realizar la frenotomía en los primeros 15 días de vida, aunque la limitación no sea muy importante		

## ¿QUÉ HAY DE NUEVO EN PEDIATRÍA DE AP?

### Los inhibidores de bomba de protones y el riesgo de infecciones graves en niños: el tiempo lo cura todo

Pregunta	Sí	No
Se ha demostrado que el uso de inhibidores de la bomba de protones en niños pequeños no produce un aumento del riesgo de infección grave		
La piel es la localización más frecuente de las infecciones que se han relacionado con el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones en niños		
El incremento en el riesgo de infecciones asociado al uso de inhibidores de la bomba de protones en la infancia descrito por algunos estudios afecta solo a los que se expusieron en el pasado, no a los niños en exposición		

## PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

### Guía de seguimiento del niño con síndrome de Down en Atención Primaria (II).

#### Programa de seguimiento y actividades preventivas

Pregunta	Sí	No
En el cribado de hipoacusia en el síndrome de Down debe realizarse una timpanometría y una audiometría conductual cada 6 meses hasta los 5 años		
En el síndrome de Down se recomienda la realización de una radiografía cervical para evaluar la presencia de inestabilidad atloaxoidea		
Existe una predisposición a infecciones en el síndrome de Down debido a una inmunodeficiencia primaria multifactorial		

## EL RINCÓN DEL RESIDENTE

### PCR capilar: un nuevo aliado

Pregunta	Sí	No
La PCR capilar tiene una adecuada correlación con la PCR venosa		
La PCR es un reactante de fase aguda que se eleva en sangre periférica a las 4-6 horas del inicio del proceso infeccioso, alcanzando su valor máximo a las 24-48 horas		
La elevación del valor de la PCR identifica los pacientes que deben tratarse con AB		

## EL AÑO DE LA NEUROLOGÍA

### Episodios paroxísticos no epilépticos

Pregunta	Sí	No
Los episodios paroxísticos no epilépticos, aunque benignos y autolimitados en el tiempo, crean bastante ansiedad familiar; su diagnóstico temprano es esencial para evitar tratamientos ineficaces e innecesarios, asesorar a los padres y buscar causas subyacentes		
Se debe sospechar síncope neurocardiogénico o vasovagal cuando el episodio aparece durante el sueño, con el ejercicio, la excitación, los ruidos o el miedo y/o haya antecedentes familiares de síncope o muerte súbita		

## EL AÑO DE LA NEUROLOGÍA

### Epilepsia y crisis epilépticas en la infancia (I): conceptos generales, causas y diagnóstico

Pregunta	Sí	No
La epilepsia viene definida por la repetición de crisis epilépticas, excluidas crisis febriles, crisis sintomáticas agudas (hipoglucemia, convulsiones asociadas a gastroenteritis aguda y crisis hipertensiva o síncope cardiaco...) y trastornos paroxísticos no epilépticos		
Establecer incorrectamente el diagnóstico de epilepsia dificulta el diagnóstico correcto y el tratamiento y las normas adecuados		
Es de especial importancia identificar crisis cardiacas (riesgo vital) o hipertensivas, hipoglucemias o alteraciones hidroelectrolíticas, que precisan tratamiento específico y no fármacos anticrisis epilépticas		

## EL AÑO DE LA NEUROLOGÍA

### Epilepsia y crisis epilépticas en la infancia (II): información, pronóstico y seguimiento

Pregunta	Sí	No
La única opción de tratamiento curativo de la epilepsia es que se deba a una lesión cerebral que tenga opción de tratamiento quirúrgico, situación que debe ser identificada y tratada cuanto antes		
El pronóstico de la epilepsia mejora con la instauración precoz de fármacos anticrisis epilépticas (FACE), por lo que la decisión de su administración debe tomarse lo antes posible		