

¿Me interesa leerlo?

¿Me interesa leer el número 1 de 2025?

Contesta a nuestras preguntas marcando **sí** o **no** en la casilla correspondiente. Comprueba si son correctas al final del test. Consulta nuestras recomendaciones de lectura según el resultado que hayas obtenido.

EDITORIAL

Tosferina: presente y futuro de una enfermedad del pasado. Discusión y reflexiones

Pregunta	Sí	No
En la última onda epidémica de tosferina de finales de 2023, el grupo de edad más afectado fue el de 5 a 9 años		
En la última versión del protocolo del Ministerio y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) para el manejo de los casos y contactos de tosferina, se consideran de alto riesgo a los lactantes con <2 meses de edad prematuros (nacidos <32 semanas) o nacidos a término solo si las madres no están vacunadas		

PUESTA AL DÍA EN...

Tosferina: presente y futuro de una enfermedad del pasado

Pregunta	Sí	No
En la actualidad existe un aumento importante en los aislamientos de <i>Bordetella pertussis</i> con exceso pertactinalo que sugiere que las personas vacunadas previamente son más susceptibles a esta cepa		
Para cumplir criterios clínicos de sospecha de tosferina, la persona debe tener tos durante, al menos, tres semanas		
Se debe aplicar profilaxis a toda persona de alto riesgo con la que se haya tenido contacto, aunque no haya sido contacto estrecho		

SITUACIONES CLÍNICAS

Utilización de probióticos en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos

Pregunta	Sí	No
Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud del huésped		
No existen efectos adversos secundarios a la administración de probióticos		
Los probióticos más efectivos para prevenir diarrea asociada a antibióticos son <i>Lactobacillus rhamnosus GG</i> y <i>Saccharomyces boulardii</i>		

PEQUEÑECES Y RAREZAS

Traumatismo cervical: manejo e indicación de pruebas complementarias

Pregunta	Sí	No
Una lesión cervical sufrida practicando buceo que produce dolor cervical se considera de alto riesgo para la indicación de radiografía cervical		
La TC cervical y la resonancia deben utilizarse para evaluar un posible daño cervical en caso de Glasgow menor de 13 y/o parestesias en extremidades		
A partir de los 2 años de edad, aproximadamente, la columna cervical infantil se asemeja a la del adulto		

MÁS ALLÁ DE LA CLÍNICA

Programa de identificación del riesgo psicosocial en la infancia y la adolescencia (IX). Factores personales (cont.): mutilación genital (I)

Pregunta	Sí	No
La resección parcial o total del glande del clítoris y los labios menores recibe el nombre de infibulación		
La mutilación genital femenina no es perseguible penalmente si se ha realizado fuera del territorio nacional		
La práctica de la mutilación genital femenina se realiza mayormente en niñas de entre 0 y 15 años		

USO RACIONAL DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Manejo de la pulsioximetría en Pediatría de Atención Primaria

Pregunta	Sí	No
La medición del pulsioxímetro no se ve alterada durante la utilización simultánea de un manguito de presión arterial en el mismo miembro		
La lectura del pulsioxímetro es igual de fiable en pieles oscuras o hiperpigmentadas		
Una crisis hemolítica puede dar una lectura falsa en el pulsioxímetro		

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA?

Fármacos antiepilépticos durante el embarazo. ¿Cuál podemos utilizar?

Pregunta	Sí	No
El valproato es uno de los fármacos antiepilépticos más seguros durante el embarazo		
El uso de fenobarbital durante el embarazo se asocia principalmente con defectos cardíacos		
El riesgo de malformaciones asociado al empleo de lamotrigina en el embarazo es independiente de la dosis empleada		

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria

Pregunta	Sí	No
El problema alimentario específico más frecuente en varones es el trastorno por atracones, seguido de la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa		
La creciente utilización de las tecnologías de la información ha abierto nuevas oportunidades para la prevención de los TCA		
La inteligencia artificial puede ayudar a diseñar programas digitales específicos adaptados a las necesidades de un adolescente concreto		

EL RINCÓN DEL RESIDENTE

Estancada en altura y algo más

Pregunta	Sí	No
En una diabetes insípida, la osmolaridad en sangre y orina puede ser normal la mayoría de las veces, debido a que casi todos los pacientes tienen acceso a líquidos y conservan el mecanismo de la sed		
Existe una variante del test de restricción hídrica que puede hacerse en Atención Primaria, sin riesgo, para diagnóstico de la diabetes insípida		

EL AÑO DE LA DERMATOLOGÍA

Estudio y derivación de los nevos melanocíticos. Actualización 2025

Pregunta	Sí	No
Hasta el 40% de los melanomas en la edad pediátrica se originan a partir de un nevo melanocítico previo		
Los nevos de Sutton y Spitz deben ser derivados para valoración por Dermatología		
Los <i>nevus spilus</i> tienen riesgo moderado de evolucionar a melanoma en la edad pediátrica		

EL AÑO DE LA DERMATOLOGÍA

Ungüentos, pomadas, cremas, espumas, geles y pastas: ¿es todo lo mismo? (2025)

Pregunta	Sí	No
La forma farmacéutica más adecuada para tratar una dermatitis atópica con lesiones exudativas en la fase aguda es el ungüento		
Se recomienda el uso de ungüentos o pomadas en lesiones infectadas o en zonas pilosas		
La absorción cutánea de un medicamento tópico varía según el estado de la piel, la edad del niño y la localización de la lesión		