

¿Me interesa leerlo?

¿Me interesa leer el número 2 de 2026?

Contesta a nuestras preguntas marcando **sí** o **no** en la casilla correspondiente. Comprueba si son correctas al final del test. Consulta nuestras recomendaciones de lectura según el resultado que hayas obtenido.

EDITORIAL

Ocho médicos, cinco años y tres diagnósticos erróneos: las enfermedades raras en la consulta del pediatra de Atención Primaria

Pregunta	Sí	No
Se denomina una enfermedad rara a aquella que tiene una frecuencia de 1 por cada 2000 nacidos vivos		
Todas las enfermedades raras tienen una causa genética		

SITUACIONES CLÍNICAS

Hidradenitis en Pediatría

Pregunta	Sí	No
La hidradenitis o hidrosadenitis es una enfermedad inflamatoria crónica del folículo piloso en zonas ricas en glándulas apocrinas (axilas, ingles, periné)		
La hidradenitis es más frecuente en hombres y suele comenzar en la infancia		
En caso de gran inflamación, se puede asociar corticoide tópico durante los primeros días o corticoides intralesionales, pero nunca corticoide oral		

PUESTA AL DÍA EN...

Fibrosis quística

Pregunta	Sí	No
En el diagnóstico de la fibrosis quística, el cribado neonatal y el test del sudor son las principales herramientas diagnósticas, complementadas con el estudio genético		
En la fibrosis quística, el tratamiento con los moduladores de CFTR, proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, debe iniciarse tan pronto como se establece el diagnóstico, incluso estando el paciente asintomático		

PEQUEÑECES Y RAREZAS

Neutropenia étnica benigna

Pregunta	Sí	No
El antígeno Duffy es una glicoproteína de superficie de los eritrocitos		
En los pacientes con neutropenia étnica benigna se ha observado un aumento en el número de las infecciones, pero no en su gravedad		
Las aftas orales recurrentes son signos que apoyan el diagnóstico de neutropenia étnica benigna		

MÁS ALLÁ DE LA CLÍNICA

Programa de identificación del riesgo psicosocial en la infancia y la adolescencia (XI). Factores personales: acoso escolar II

Pregunta	Sí	No
Una de las estrategias de prevención del acoso escolar desde las consultas pediátricas consiste en incorporar preguntas sobre la vida social y escolar		
No existen instrumentos específicos que permitan evaluar la presencia de acoso y su impacto en la salud emocional y social		
Tanto para los casos sospechosos de acoso escolar como para los confirmados, el código CIE-10 adecuado es: Z604 AE		

USO RACIONAL DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Aproximación al diagnóstico *in vitro* de las enfermedades alérgicas

Pregunta	Sí	No
La inmunoterapia específica no resulta efectiva si los síntomas clínicos del paciente son causados únicamente por la sensibilización a panalérgenos en lugar de a alérgenos primarios		
El término "sensibilización" es equivalente a "reactividad clínica", por lo que cualquier paciente con IgE específica positiva presentará síntomas al exponerse al alérgeno		
En el caso de la alergia al cacahuete, la IgE específica tiene una sensibilidad muy alta (96%), pero una especificidad considerablemente baja (59%), lo que impide confirmar el diagnóstico solo con la prueba		

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Prevención del cáncer de piel y consejo sobre medidas de fotoprotección

Pregunta	Sí	No
En España, durante la época invernal, la producción cutánea de vitamina D pasa a ser prácticamente nula en los territorios situados por encima de los 42° de latitud norte		
En España, la legislación vigente prohíbe estrictamente el uso de fuentes artificiales de radiación ultravioleta, como las camas bronceadoras y lámparas solares, en menores de 18 años		

EL RINCÓN DEL RESIDENTE

Cuando dar los primeros pasos duele

Pregunta	Sí	No
La fractura de Toddler está relacionada con una caída aparatosa de un mayor de 3 años que no produce dolor ni cojera		
La imagen radiológica de las fracturas de los primeros pasos es muy llamativa y desproporcionadamente complicada en relación al traumatismo		

EL AÑO DE LA URGENCIA (I)

Atención inicial al paciente politraumatizado

Pregunta	Sí	No
En la actualidad, ante un neumotórax a tensión en Pediatría, se recomienda priorizar la descompresión urgente en el 4.º o 5.º espacio intercostal en la línea medioaxilar, por encima del abordaje clásico en la línea medioclavicular		
Para mantener la permeabilidad de la vía aérea, la cánula orofaríngea está indicada tanto en pacientes politraumatizados inconscientes como en pacientes conscientes o semicomatosos		
El uso de ácido tranexámico en pacientes con sospecha de hemorragia grave tras un trauma se recomienda dentro de las primeras tres horas, administrando un bolo inicial de 15 mg/kg		

EL AÑO DE LA URGENCIA (II)

Urgencias estivales en la consulta pediátrica

Pregunta	Sí	No
En la limpieza de las quemaduras solares de segundo grado superficiales, se deben evitar los jabones con clorhexidina o similares, dado que interfieren en el proceso de cicatrización		
Ante la lesión por contacto con una medusa "carabela portuguesa", la aplicación de frío local ha demostrado recientemente ser más eficaz para controlar el dolor que la inmersión en agua caliente		
Tras retirar una garrapata adherida a la piel de un niño de forma correcta, se recomienda realizar un cribado serológico de rutina y pautar antibioterapia profiláctica		